

**ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У БОЛЬНЫХ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ**

Ирбутаева Парвина Юсуфзода, магистрант,
Самаркандский Государственный
медицинский университет, г.Самарканд,
+998889344883
yusufzodap@gmail.com

Ирбутаева Нигора Дилшодовна, ассистент,
Самаркандский Государственный
медицинский университет, г.Самарканд,
+998915234717
irbutayevanigora@gmail.com

Аннотация: В данной работе рассматриваются увеличение роста, методы реабилитации и лечения, экономические затраты больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки населения Узбекистана. Применение базисной терапии в комплексе с санитарно-курортным лечением, что приводит к снижению уровня инвалидности.

Ключевые слова: язвенная болезнь, реабилитация, терапия, лечение, эффективность.

Актуальность.

Установлено, что в Узбекистане за последние 10 лет количество больных заболеваниями ЖКТ выросло на 22,4 %. Ежегодный средний прирост составил 2,65 %. Высокий ежегодный средний прирост наблюдается в городе Ташкент, а отрицательный прирост увеличения

болезней ЖКТ наблюдается в Бухарской области. В городе Ташкент увеличение числа больных происходит за счёт роста заболеваемости среди детей и подростков, в Самаркандской, Ташкентской и Сырдарьинских областях увеличение численности больных наблюдается за счёт взрослого населения.[1]

Цель исследования.

Исследовать влияние реабилитации язвенной болезни двенадцатиперстной кишки на снижение экономических затрат пациентов и системы здравоохранения, включая расходы на лечение обострений, потерю трудоспособности и социальной адаптации.

Материалы и методы исследования.

Исследование проводилось в 1-клинике Самаркандского Государственного Медицинского Университета. В основу исследования выбрано 74 больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. Из них женщин (27 %), мужчин (73%). Исследование проводилось в 1-клинике Самаркандского Государственного Медицинского Университета в отделении общей хирургии. Пациенты были разделены на 2 группы. Пациенты до и после оперативного вмешательства. Основная группа получала базисную терапию. С целью комплексной терапии гемостатиков использовались аминокaproновая кислота 5 % 100 мл внутривенно, этамзилат 12,5 % внутримышечно. В качестве питательной терапии использовались раствор глюкозы 5% и аскорбиновой кислоты 5% внутривенно. В качестве белковых растворов была применена эритроцетарная масса и торрокс 200 мл внутривенно. В качестве реабилитационной терапии больные были направлены на санитарно-курортные лечения, включающие климатотерапию, диетотерапию, физиотерапевтические процедуры и лечебную физкультуру.

При определении социальной эффективности реабилитационных мероприятий были использованы специально разработанные анкеты,

которые анонимно были заполнены 68 пациентами в период после реабилитации. Результаты анкетирования показали о высоком уровне удовлетворённости пациентов санаторно-курортным лечением, которое они рассматривают как важный элемент комплексного восстановления при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Средний срок наблюдения при восстановительном лечении составил 9 месяцев.

Результаты и их обсуждение.

В период 6 месяца курса лечения отмечалось значительное улучшение у 58 больных (78.4%). Пациенты чувствовали значительное облегчение общего состояния. Были устранены болевые, диспептические и психоэмоциональные расстройства, и они быстрее вернулись к повседневному образу жизни. Причиной отсутствия улучшений у (21.6%) пациентов являются остаточные осложнения сопутствующих болезней.

Заключение. Таким образом, применение базисной терапии в комплексе с санитарно-курортным лечением приводила к снижению уровня инвалидности, уменьшению расходов, а также улучшает качество жизни пациентов, позволяя им сохранять трудоспособность.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Умарова, Ш. З. Анализ статистики гастроэнтерологических больных в Республике Узбекистан / Ш. З. Умарова, Наргиза Мухамед Умаровна Султанбаева, А. З. Норов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 3 (241). — С. 100-105.
2. Ирбутаева, П. Ю., Тогамуродова, Ж. Ж., & Ирбутаева, Н. Д. (2025). МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ. *Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии*, 14(9), 359-361.

3. ВАЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВОЙ ДВЕНАДЦАТОЙ КИШКИ.

(2025). Международный журнал искусственного интеллекта , 5 (10), 814-816.

<https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/citationstylelanguage/get/apa?submissionId=6933&publicationId=7029&issueId=360>