



TARQALGAN PERITONIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI DAVOLASHDA PLAZMOFEREZNING AHAMIYATI

Xasanov Sh.N.

Andijon davlat tibbiyot instituti,
Anesteziologiya reanimatologiya va
tez tibbiy yordam kafedrası assitenti
Andijon, O'zbekiston.

Ilmiy ishning maqsadi: Tarqalgan peritonit bilan og'rigan bemorlarda plazmoferez (ekstrakorporal detoksikatsiya) usulini qo'llash shuningdek davolash samaradorligini yaxshilash va davolashning bevosita natijalarida asoratlarni oldini olish va optimal intensiv terapiya usullarini qo'llash. Terapevtik plazmaferezning optimal davolash usullarini ishlab chiqish va uni terapevtik davolash chora-tadbirlar kompleksida qo'llash orqali sepsis bilan asoratlangan diffuz yiringli peritonit bilan og'rigan bemorlarda tashrixdan keyingi asoratlar va o'lim sonini kamaytirish.

Materiallar va usullar: 2023–2026 yillarda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filialida davolangan ikkilamchi peritonitning tarqalgan shakliga ega 85 bemor natijalari tahlil qilindi. Bemorlar ikki guruhga bo'lindi. Guruhlar qorin bo'shlig'idagi patologik o'zgarishlar va peritonit darajasi bo'yicha solishtirildi. Asosiy guruhda (56 bemor) ishlab chiqilgan algoritm asosida relaparotomiya 2 sutka ichida bajarildi. Taqqoslash guruhida esa 29 bemorda qayta operatsiyalar "talab bo'yicha" usulida o'tkazildi, ya'ni qorin bo'shlig'ida peritonitning rivojlanishi yoki progressiyasi belgilari paydo bo'lganda bajarildi. Natijalar letallik, asoratlar chastotasi, reanimatsiya va statsionarda qolish davomiyligi bo'yicha baholandi.



Tadqiqot natijalari va muhokama. Tarqalgan peritonitli bemorlarda rejalashtirilgan relaparotomiyani differensial yondashuv asosida qo'llash umumiy o'lim ko'rsatkichini 1,7 marta kamaytirishga imkon berdi (51,3 % dan 30,2 % gacha) ($p=0,001$). Bunga abdominal sepsis oqibatida yuzaga keladigan patologik natijalar kamaygani sabab bo'ldi. Ushbu algoritmni qo'llash asoratlari soni va ko'p a'zoli yetishmovchilik davomiyligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmadi.